

TED は標的と強固な化学結合を形成するため、当初は一度結合すると離れない錨（いかり）のような役割を持つと考えられてきました。しかし本研究では、分子間相互作用（注 7）をリアルタイムで計測するバイオレイヤー干渉法（注 8）を用いることで、TED の強固な結合が周囲の弱酸性化によって速やかに解離することを示しました（図 1）。本成果は、TED の生理的意義を捉え直し、遺伝子発現制御に比べて迅速な、接着分子自体の化学反応による環境応答モデルを提案するものです。今後、多様な細菌の生存戦略や感染機構の理解につながると期待されます。




図 1：TED による共有結合型接着の反応モデルと pH 応答的解離

(A) TED と標的分子の反応モデル。TED は非共有結合により標的分子を認識し、その後チオエステル結合を介して分子間を強固に架橋する。本研究では、二段階目の架橋反応が可逆反応であり、pH 応答的に制御されていることを明らかにした。

(B) バイオレイヤー干渉法を用いた分子間相互作用のリアルタイム計測。TED と標的分子を 120 秒間反応させた後、pH の異なる溶液で洗浄したところ、pH が低いほど二分子は急速に解離した。

発表内容

TED は幅広い細菌系統の接着分子に含まれるドメインで、分子内に高反応性のチオエステル結合（注 9）を持ちます。この結合が標的分子と反応すると、細菌と標的分子が強固な共有結合（注 10）でつながり、咳や血流などによる物理的な力に耐えて、付着を維持すると考えられています。一方、強い力のかからない穏やかな環境で TED がどのように振る舞うかについては明らかになっていませんでした。

本研究では、タンパク質同士の結合や解離をリアルタイムで計測できるバイオレイヤー干渉法を用い、A 群レンサ球菌（注 11）の接着分子 SfbI（注 12）に含まれる TED 領域（SfbI-TED）と、その標的分子であるヒト血漿タンパク質フィブリノゲン（注 13）の相互作用を解析しました。その結果、SfbI-TED は一度形成したフィブリノゲンとの共有結合を自発的に切断し、解離できることが分かりました。また、この解離は環境が弱酸性になると促進されました（図 1）。

さらに、熱力学的解析から、この pH 応答は主に、チオエステル結合を介した化学反応そのものの性質に由来することが示されました。つまり、pH によって、標的との共有結合を形成する反応と、それを解消する逆反応の起こりやすさのバランスが変わります。この反応は TED ファミリーに共通するため、今回発見された pH 応答性は A 群レンサ球菌のみならず、幅広い細菌の TED に共有されていると考えられます。実際、A 群レンサ球菌とは分類学的に遠縁なウェルシュ菌（注 14）の接着分子 CpTIE に含まれる TED でも、チオエステル結合の反応に pH 依存性が確認されました（図 2）。

この性質は、細菌と宿主との相互作用の切り替えに利用されている可能性があります。例えば A 群レンサ球菌は、フィブリノゲンを身にまとうことで宿主の免疫細胞による排除を受けにくくなる一方、他の接着因子の働きが妨げられ、宿主細胞への付着効率が低下することが報告されています。そのため、pH に応じたフィブリノゲンの結合・解離は、免疫回避と宿主細胞へ

の付着の切り替えに役立つ可能性があります。また、本研究の対象とした接着分子 **SfbI** には、宿主細胞への侵入を助ける領域があります。こうした細胞内への侵入は、咽頭炎の治療後にも細菌が残り、再発につながる一因として指摘されています。フィブリノゲンの結合状態がこの領域の働きにも影響するのであれば、TED の pH 応答は細胞侵入の調節にも関与する可能性があります (図 3)。

本研究は、物理的な力に耐える接着因子として知られてきた TED に、遺伝子発現制御を介さず、分子自体の化学反応によって迅速に環境に応答するという新たな役割を提案するものです。これらの成果は、病原細菌の感染機構や、土壌・海洋細菌の生存戦略の理解につながると期待されます。




図 2：系統的に離れた TED における pH 応答性

(A) TED 保有細菌の系統樹 (一部抜粋)。(B) 共有結合接着のしやすさ (チオエステル結合の反応性の高さ)。A 群レンサ球菌由来の SfbI-TED とウェルシュ菌由来の CpTIE-TED の両方が pH 応答性を示した。

仮説：免疫回避と細胞侵入を pH に応じて切り替える仕組み




図 3：TED を介した感染形態の切り替えに関する仮説モデル

pH 7.4 では TED は組織液や血液中のフィブリノゲン (Fg) と結合することができる。これにより、A 群レンサ球菌が宿主免疫系による排除を受けにくくなる可能性がある。一方、pH 6.0 では TED と結合していたフィブリノゲンが解離し、SfbI 根元のフィブロネクチン結合部位が露出することで、宿主細胞への侵入が促進される可能性がある。

発表者・研究者等情報

東京大学

大学院工学系研究科

津本 浩平 教授

兼：同大学医科学研究所 附属疾患プロテオミクスラボラトリー 教授

松長 遼 助教

徳永 悠希 研究当時：博士課程

現：同大学医科学研究所 特任研究員

医科学研究所 附属疾患プロテオミクスラボラトリー

尾山 大明 准教授

秦 裕子 シニアエキスパート（技術）

論文情報

雑誌名：Science Advances

題 名：Chemically encoded pH-tunable covalent adhesion by a bacterial thioester domain

著者名：Yuki Tokunaga, Ryo Matsunaga*, Hiroko Kozuka-Hata, Masaaki Oyama, Kouhei Tsumoto*

DOI: 10.1126/sciadv.aeg7646

URL: <https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aeg7646>

研究助成

本研究は、AMED「ワクチン開発のための世界トップレベル研究開発拠点の形成事業（ワクチン開発のための世界トップレベル研究開発拠点群東京フラッグシップキャンパス（東京大学新世代感染症センター）」、「ワクチン・新規モダリティ研究開発事業（100 日でワクチンを提供可能にする革新的ワクチン評価システムの構築）」、「創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業（創薬モダリティ開発加速及び機能制御分子探索のための物理化学的解析支援）」、JSPS 科研費「国際共同研究加速基金（国際先導研究）（課題番号：JP22K21343）」、JST「ACT-X（課題番号：JPMJAX222I）」の支援により実施されました。

用語解説

（注 1）細菌系統

進化の道筋や共通祖先との関係に基づく、細菌のまとまり。TED の場合、A 群レンサ球菌やウェルシュ菌が属する厚壁菌門に加え、放線菌門でも報告されている。このように、近縁な菌種の間だけでなく、「門」という大きな分類区分をまたいで分布しており、TED は多様な細菌が接着に利用する共通の仕組みを持つことが示唆されている。

（注 2）接着分子

細菌が宿主の細胞や組織、周囲の物質などに付着するために使う分子。細菌の表面にあるタンパク質などがこの役割を担い、細菌の定着を助ける。接着分子には、TED のように特定の標的と相互作用するものの他に、標的を問わず多様な物質に結合できるものもある。

(注 3) チオエステルドメイン (TED)

タンパク質の中で、まとまった立体構造を持ち、特定の機能を担う部分をドメインという。TED は、内部にチオエステル結合 (注 9) を持つドメインで、細菌の接着分子に見られる。TED はさまざまな細菌から見つかったが、そのアミノ酸配列や標的分子は TED ごとに異なる。これらの多様な TED を総称して TED ファミリーと呼ぶ。

(注 4) pH

水溶液の酸性・アルカリ性の程度を表す指標。25℃では pH 7 が中性で、それより小さい値では酸性、大きい値ではアルカリ性となる。本研究では、中性付近の pH 7.3 や弱酸性の pH 6.0 など TED の性質を調べた。

(注 5) 宿主

細菌やウイルスなどが生息・感染する相手となる生物。本研究で扱う A 群レンサ球菌とヒトの関係では、ヒトが宿主にあたる。

(注 6) 遺伝子発現の制御

生物の設計図である遺伝子の中から、どのタンパク質や核酸をどれだけ作るかを変える仕組み。例えば、体ができる過程で各臓器がそれぞれの場所に形作られることや、感染に応じて免疫細胞が抗体を盛んに生産することにも関わる。細菌もこの仕組みを使い、周囲の環境に応じて必要なタンパク質を作り分けている。

(注 7) 分子間相互作用

分子同士の間で働く引力や反発力などの作用。タンパク質は他の分子と相互作用することで、細胞への付着や情報伝達など、さまざまな生命活動を担う。本研究では、TED と標的タンパク質が結合し、解離する過程に着目した。

(注 8) バイオレイヤー干渉法

センサー表面で分子が結合・解離する様子を、光の干渉の変化からリアルタイムで測定する手法。センサーに固定した分子に別の分子が結合すると、表面の分子層の厚さが変わることを利用する。タンパク質や低分子化合物などの結合や解離の速さ、結合のしやすさなどを調べることができる。

(注 9) チオエステル結合

カルボニル基と硫黄原子を含む、反応性の高い化学結合の一種。TED では、この結合が標的タンパク質のアミノ基と反応する。反応に伴って TED 内部のチオエステル結合が切れ、代わりに TED と標的タンパク質をつなぐ新たな共有結合 (イソペプチド結合) が形成される。

(注 10) 共有結合

原子同士が電子を共有して強く結びつく化学結合。タンパク質を構成するアミノ酸同士をつなぎ、その骨格を形作る結合も共有結合である。一方、タンパク質が他の分子と結びつく際には、通常、比較的弱い非共有結合を複数組み合わせている。TED は、分子内部のチオエステル結合と、標的分子につながるイソペプチド結合という二つの共有結合の状態を切り替えることができる。

(注 11) A 群レンサ球菌

学名は *Streptococcus pyogenes*。咽頭炎や扁桃炎などを引き起こす細菌で、皮膚や軟部組織の感染症の原因にもなる。致死率の高い劇症型溶血性レンサ球菌感染症を引き起こすこともあり、「人食いバクテリア」として報道されることもある。国内では 2023～2024 年に劇症型感染症の報告数が増加した。

(注 12) SfbI

A 群レンサ球菌の表面にある接着タンパク質。フィブリノゲン（注 13）と結合する TED に加え、別の宿主タンパク質であるフィブロネクチンに結合する領域を持ち、宿主細胞への付着や侵入に関わる。

(注 13) フィブリノゲン

血液に豊富に含まれ、止血のために働くタンパク質。出血時にはフィブリンという繊維状の物質に変わり、血液を固めて出血を止める。A 群レンサ球菌を含む一部の病原細菌は、このタンパク質を自身の表面に結合させ、免疫細胞による取り込み・排除を受けにくくするために利用していることが知られている。

(注 14) ウェルシュ菌

学名 *Clostridium perfringens*。土壌やヒト・動物の腸管などに存在し、煮物料理で発生する食中毒の原因菌としても知られる。本研究では、この菌の接着分子 CpTIE に含まれる TED を調べた。

問合せ先

〈研究内容について〉

東京大学大学院工学系研究科

教授 津本 浩平（つもと こうへい）

助教 松長 遼（まつなが りょう）

<https://www.chembio.t.u-tokyo.ac.jp/department/lab/tsumoto.html>

〈機関窓口〉

東京大学大学院工学系研究科 広報室

<https://www.t.u-tokyo.ac.jp/>

東京大学医科学研究所 プロジェクトコーディネーター室（広報）

<https://www.ims.u-tokyo.ac.jp/imsut/jp/>