ヘルスビッグデータを用いた健康長寿イノベーション

東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センター
DNA情報解析分野 教授
宮野 悟

1. 日本人DNAデータを用いた日本人の ための疾病リスク予測モデルの研究

PubMed*に登録されており、ゲノムワイド関連
解析 (GWAS) を用いた論文のある

- 282種の疾患
- 437種の体質

これらの疾患・体質の
研究論文を調査

- 単一遺伝子疾患
- 家族性腫瘍
- 小児疾患
- 先天性疾患 は除外

*PubMed: 米国国立医学図書館
(National Library of Medicine)が
作成している医学生物学の文献
データベース。

5

エビデンスのレベル分類

↑

エビデンスレベル

I	システマティック・レビュー／RCTのメタアナリシス	介入研究
II	1つ以上のランダム化比較試験	
III	非ランダム化比較試験による	
IVa	分析疫学的研究(コホート研究)	観察研究
IVb	分析疫学的研究(症例対照研究、横断研究)	
V	記述研究(症例報告やケース・シリーズ)	↑ GWASによる ゲノムと疾患・体質の 関連解析
VI	患者データに基づかない、専門委員会や 専門家個人の意見	

Minds 診療ガイドライン作成の手引き 2007 より
<http://minds4.jcqhc.or.jp/minds/glg1/glg1.pdf>

6

米国 NIH GWASカタログ

genome.gov
National Human Genome Research Institute
NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH

<http://www.genome.gov/gwastudies/>

約1,900のゲノムと疾患、ゲノムと体質をGWASにより解析した論文に基づく
SNP のデータベース

前立腺がんの例

Date Added to Catalog (since 11/25/08)	First Author/Date/ Journal/Study	Disease/Trait	Initial Sample Size	Replication Sample Size	Region	Reported Gene(s)	Mapped Gene(s)	Strongest SNP-Risk Allele	Context	SNP type	Risk Allele Frequency in Controls	P-value	OR Type	OR or beta-coefficient and [95% CI]	Platform [SNPs passing QC]	CNV
11/25/08	Eeles RA February 10, 2008 Nat Genet Multiple newly identified loci associated with prostate cancer susceptibility.	Prostate cancer	1,854 cases, 1,894 controls	3,268 cases, 3,366 controls	10q11.23	MSMB	-	rs10993994-T	nearGene-5	Novel	0.40	9×10^{-22}	Y	1.25 [1.17-1.34]	Illumina [541,129]	N
					19q13.33	KLK3	-	rs2735839-G		Novel	0.85	2×10^{-18}	Y	1.2 [1.10-1.33]		
					8q24.21	Intergenic	-	rs4242384-C		Known	0.09	3×10^{-16}	Y	1.88 [NR]		
					8q24.21	Intergenic	-	rs6983262-G	ncRNA;intron	Known	0.49	9×10^{-13}	Y	1.42 [NR]		
					11q13.3	Intergenic	-	rs7931342-G		Novel	0.51	2×10^{-12}	Y	1.19 [1.11-1.27]		
					17q12	HNF1B	-	rs7501939-C	intron	Known	0.57	9×10^{-12}	Y	1.41 [NR]		
					6q25.3	SLC22A3	-	rs9364544-T	intron	Novel	0.29	6×10^{-10}	Y	1.17 [1.08-1.26]		
					7q21.3	LMTK2	-	rs6465652-C	intron	Novel	0.46	1×10^{-9}	Y	1.12 [1.05-1.20]		
					Xp11.22	NUDT10, NUDT11	-	rs5945619-C		Novel	0.36	2×10^{-9}	Y	1.19 [1.07-1.31]		
					3p12.1	Intergenic	-	rs2660753-T		Novel	0.11	3×10^{-8}	Y	1.18 [1.06-1.31]		
					8q24.21	Intergenic	-	rs1016343-T	ncRNA	Known	0.18	1×10^{-2}	Y	1.37 [NR]		
					17q24.3	Intergenic	-	rs1859962-G	intron	Known	0.46	1×10^{-6}	Y	1.26 [NR]

抽出データテーブル

論文の PubMed ID

SNP ID 人種・GWAS Stage

SNP (rs number)	sample (race)	case number	control number	number of typing SNPs
rs13385191	Japanese(GWAS)	1583	3386	510687
	Japanese(Replication)	3001	5415	91
	Japanese(Combined)	-	-	-

サンプル数 タイピング数

リスクアレル アレル頻度

normal allele / risk allele	risk allele	
	case	control
A/G	0.594	0.545
	0.593	0.561
	0.593	0.558

リスク SNP 同定に
至るデータ解析の構造

基本データテーブル #8 前立腺がん

Ref No	SNP (rs number)	sample (race)	case number	control number	number of typing SNPs	typing Platform	phenotype definition	normal allele / risk allele	case	control	odds	RR	P value	screening/meta-analysis strategy
PMID:20676088	rs13385191	Japanese(GWAS)	1583	3386	510687	Illumina multiplex PC	Prostate cancer	A/G	0.594	0.545	1.22(allele)	1.49(allele)	1.10E-05	Stage="Step1" Data="GWAS" Race="Japanesel" n="1583/3386", p-value="GC_log_allele1.1x10^-5"
		Japanese(Replication)	3001	5415	91	Illumina multiplex PC	Prostate cancer	A/G	0.593	0.561	1.12(allele)	1.25(allele)	7.40E-04	Stage="Step1" Data="GWAS" Race="Japanesel" n="3001/5415", p-value="GC_log_allele1.1x10^-4"
		Japanese(Combined)	-	-	-	-	-	Prostate cancer	A/G	0.593	0.558	1.15(allele)	1.32(allele)	7.50E-08
rs12853946	rs12853946	Japanese(GWAS)	1583	3386	510687	Illumina multiplex PC	Prostate cancer	C/T	0.5	0.434	1.31(allele)	1.72(allele)	2.80E-09	Stage="Step1" Data="GWAS" Race="Japanesel" n="1583/3386", p-value="GC_log_allele1.1x10^-5"
		Japanese(Replication)	3001	5415	91	Illumina multiplex PC	Prostate cancer	C/T	0.498	0.454	1.23(allele)	1.17(allele)	1.20E-10	Stage="Step1" Data="GWAS" Race="Japanesel" n="3001/5415", p-value="GC_log_allele1.1x10^-4"
		Japanese(Combined)	-	-	-	-	-	Prostate cancer	C/T	0.499	0.445	1.28(allele)	1.28(allele)	3.90E-18
rs1963891	rs1963891	Japanese(GWAS)	1583	3386	510687	Illumina multiplex PC	Prostate cancer	C/T	0.44	0.44	1.22(allele)	1.49(allele)	1.10E-05	Stage="Step1" Data="GWAS" Race="Japanesel" n="1583/3386", p-value="GC_log_allele1.1x10^-5"
		Japanese(Replication)	3001	5415	91	Illumina multiplex PC	Prostate cancer	C/T	0.64	0.68	1.12(allele)	1.25(allele)	7.40E-04	Stage="Step1" Data="GWAS" Race="Japanesel" n="3001/5415", p-value="GC_log_allele1.1x10^-4"
		Japanese(Combined)	-	-	-	-	-	Prostate cancer	C/T	0.67	0.67	1.15(allele)	1.32(allele)	7.50E-08
rs339331	rs339331	Japanese(GWAS)	1583	3386	510687	Illumina multiplex PC	Prostate cancer	C/T	0.42	0.42	1.12(allele)	1.25(allele)	7.40E-04	Stage="Step1" Data="GWAS" Race="Japanesel" n="1583/3386", p-value="GC_log_allele1.1x10^-4"
		Japanese(Replication)	3001	5415	91	Illumina multiplex PC	Prostate cancer	C/T	0.42	0.42	1.12(allele)	1.25(allele)	7.40E-04	Stage="Step1" Data="GWAS" Race="Japanesel" n="3001/5415", p-value="GC_log_allele1.1x10^-4"
		Japanese(Combined)	-	-	-	-	-	Prostate cancer	C/T	0.42	0.42	1.12(allele)	1.25(allele)	7.40E-04
rs9600079	rs9600079	Japanese(GWAS)	1583	3386	510687	Illumina multiplex PC	Prostate cancer	G/T	0.42	0.42	1.15(allele)	1.32(allele)	7.50E-08	Stage="Step1" Data="GWAS" Race="Japanesel" n="1583/3386", p-value="GC_log_allele1.1x10^-5"
		Japanese(Replication)	3001	5415	91	Illumina multiplex PC	Prostate cancer	G/T	0.42	0.42	1.15(allele)	1.32(allele)	7.50E-08	Stage="Step1" Data="GWAS" Race="Japanesel" n="3001/5415", p-value="GC_log_allele1.1x10^-4"
		Japanese(Combined)	-	-	-	-	-	Prostate cancer	G/T	0.42	0.42	1.15(allele)	1.32(allele)	7.50E-08
rs1485618	rs1485618	Japanese(GWAS)	1583	3386	510687	Illumina multiplex PC	Prostate cancer	G/A	0.71	0.71	1.15(allele)	1.32(allele)	7.50E-08	Stage="Step1" Data="GWAS" Race="Japanesel" n="1583/3386", p-value="GC_log_allele1.1x10^-5"
		Japanese(Replication)	3001	5415	91	Illumina multiplex PC	Prostate cancer	G/A	0.71	0.71	1.15(allele)	1.32(allele)	7.50E-08	Stage="Step1" Data="GWAS" Race="Japanesel" n="3001/5415", p-value="GC_log_allele1.1x10^-4"
		Japanese(Combined)	-	-	-	-	-	Prostate cancer	G/A	0.71	0.71	1.15(allele)	1.32(allele)	7.50E-08

phenotype definition

case	control
Prostate cancer	Healthy

疾病 コントロール

odds

NN	RN	RR	P value
1	1.22(allele)	1.49(allele)	1.10E-05
1	1.12(allele)	1.25(allele)	7.40E-04
1	1.15(allele)	1.32(allele)	7.50E-08

オッズ比 p値

(略) 前立腺がんでは 14617

#44 PMID:23464444 rs17127900 Northern Chinese 289 288 - - Prostate cancer Healthy G/A 0.153 0.084 1 1.64(allele) 2

5.0 × 10⁻⁸ 以下の SNP を統計的有意と見なす

品質管理手順と情報の更新

約1,400報の候補論文 (GWASカタログには約1,900報)

論文スクリーニング @DeNA

↓

選定論文(約450報)

↓

データ抽出 @DeNA

↓

抽出データテーブル

↓

データ抽出 @DeNA

↓

抽出データテーブル

抽出データテーブル

↓

校閲

↓

チェック済みデータテーブル

↓

データ抽出 @DeNA

↓

データベース

約4,000の疾患・体質関連SNPが同定されたヒストリー込み

医科研教員

- データ抽出手法の考案
- 検査ロジックの検討
- 全体のスーパーバイズ

データ突合せによる校閲

7割以上の論文は4回分析 8割以上の論文は2回以上分析

	疾患	体質	計
候補論文数	946	469	1415
選定論文数	294	148	442
GWASカタログに登録ない論文数	6	4	8
1回精読した論文数	53	17	70
2回精読した論文数	57	-	57
4回精読した論文数	184	131	315
著者に確認した件数	23件	5件	28件
総抽出SNP数	3,141	555	3,696

13

米国 NHI GWAS カタログ

卵巣がん(漿液性浸潤性上) rs757210-G G がリスクアレルと書かれているが...

Date Added to Catalog (since 11/25/08)	First Author/Date/ Journal/Study	Disease/Trait	Initial Sample Size	Platform [SNPs passing QC]	CHV
07/12/13	Pharoah PD April 01, 2013 Nat Genet GWAS meth-analysis	Ovarian cancer	3,769 European ancestry cases, 211 East Asian cases, 972 East Asian controls.	Illumina [2,508,744] (Imputed)	N

【論文のデータ】
 Table 2 ORs and tests of association by histological subtype and population for the most strongly associated SNPs at 8q21, 10p12 and 17q12

SNP	Locus	Ref/alt allele	RAF	Subtype	Ancestry	OR	95% CI	P
rs757210	17q12	G/A	0.37	All Invasive	European	1.05	1.02-1.09	0.00090
			0.37	Serous	European	1.12	1.08-1.17	8.1 × 10 ⁻¹⁰
			0.37	Endometrioid	European	0.98	0.91-1.04	0.47
			0.37	Clear cell	European	0.80	0.72-0.88	3.9 × 10 ⁻⁶
			0.37	Mucinous	European	0.89	0.81-0.99	0.027
			0.29	Serous	Asian	1.10	0.87-1.37	0.43
			0.53	Serous	African	1.08	0.75-1.54	0.69
			0.37	Serous	Mixed	0.86	0.73-1.02	0.093

Ref/alt allele: G/A

【dbSNPの情報】

rs#	Population	Sample Ascertainment	Chrom.	Source	Genotype Detail			Alleles		
					A/A	A/G	G/G	A	G	
rs114298599	HapMap-CEU	European	120	IG	0.150	0.567	0.283	0.251	0.433	0.567

このSNPはマイナーアレル(A)がリスクと判断されるが GWAS カタログはそうはなっていない。
最終的に著者に問い合わせ、マイナーアレル(A)がリスクであることを確認

論文で解析された CEU サンプルで A がマイナーアレルであると確認

14

論文の分析により GWAS カタログには ない情報を抽出

【ベーチェット病 Behçet's disease】

pubmed_id	snp	race	stage	case_num	ctrl_num	phenotype_case	phenotype_ctrl	Normal_allele	Risk_allele	Odds_nn	Odds_rn	Odds_rr	p_value
rs1495965		Japanese	GWAS	612	740	Behçets's disease	Healthy controls	A	G	1	1.56	2.43	1.20E-08
		Turkish	Replication	1215	1279	Behçets's disease	Healthy controls	A	G	1	1.25	1.56	8.40E-05
		Korean	Replication	119	140	Behçets's disease	Healthy controls	A	G	1	1.35	1.82	9.40E-02
20622879		Japanese, Turkish, Korean	Combined	1946	2159	Behçets's disease	Healthy controls	A	G	1	1.35	1.82	1.90E-11
		Japanese	GWAS	612	740	Behçets's disease	Healthy controls	C	T	1	1.64	2.69	9.50E-09
		Turkish	Replication	1215	1279	Behçets's disease	Healthy controls	C	T	1	1.36	1.85	3.10E-07
rs1800871		Korean	Replication	119	140	Behçets's disease	Healthy controls	C	T	1	1.51	2.28	4.40E-02
		Japanese, Turkish, Korean	Combined	1946	2159	Behçets's disease	Healthy controls	C	T	1	1.45	2.10	1.00E-14
		Japanese	GWAS	612	740	Behçets's disease	Healthy controls	G	A	1	3.18	10.11	1.80E-26

Step 1: GWAS ステージ **日本人データ** ←
 Step 2: Replication ステージ トルコ人データ
 Replication ステージ 韓国人データ
 Step 3: Combined ステージ 日本人+トルコ人+韓国人データ

日本人のみのデータからの結果を抽出可能

【ブルガダ症候群 Brugada syndrome】

pubmed_id	snp	race	stage	Case_num	Ctrl_num	phenotype_case	Phenotype_ctrl	Normal_allele	Risk_allele	Odds_nn	Odds_rn	Odds_rr	p_value
23872634	rs10428132	European	Discovery GWAS	312	1115	Brugada syndrome	Control	G	T	1	3.00	9.00	6.79E-26
		European	Replication 1	594	806	Brugada syndrome	Control	G	T	1	2.35	5.52	1.66E-30
		Japanese	Replication 2	208	1016	Brugada syndrome	Control	G	T	1	2.56	6.55	1.56E-16
		European, Japanese	Combined meta-analysis	416	2937	Brugada syndrome with symptoms	Control	G	T	1	2.84	8.07	1.15E-39

Step 1: GWAS ステージ ヨーロッパ人データ
 Step 2: Replication ステージ ヨーロッパ人データ
 Replication ステージ 日本人データ ←
 Step 3: Combined ステージ ヨーロッパ人+日本人データ

構築した疾病リスク予測モデル 体質解析モデル 289

158疾患

日本人データに基づくモデル	43
東アジア人データに基づくモデル	30
ヨーロッパ他データに基づくモデル	85

131体質

日本人データに基づくモデル	27
東アジア人データに基づくモデル	16
ヨーロッパ他データに基づくモデル	88

- 1/4が日本人データに基づくモデル
- 東アジア人対応116モデル
- モデルに用いられている SNP の約20%は、論文の分析によって GWAS カタログにはない情報を抽出したもの
- 9件の GWAS カタログの誤記を修正したものを含む

- ## 3. ヘルスビッグデータ社会実装にあたって の ELSI 面での課題抽出と対処法の研究
1. 現行法・指針等と調和したDTC検査起業化にとって必要な要件に関する助言。
 2. 諸外国におけるDTC検査の規制状況に関する調査研究
 3. 診療、研究での対応と調和した、DTC検査における偶発的・二次的所見への対応方策の検討
- 18

3. ヘルスビッグデータ社会実装にあたっての ELSI 面での課題抽出と対処法の研究

1. 現行法・指針等と調和したDTC検査起業化にとって必要な要件に関する助言
2. 諸外国におけるDTC検査の規制状況に関する調査研究
3. 診療、研究での対応と調和した、DTC検査における偶発的・二次的所見への対応方策の検討

19

諸外国でのDTC検査規制状況

米国(2007年6月の調査)		
	DTC検査への規制なし	25州とコロンビア特別区
	条件／制限付きで容認 (検査内容、検査を発注できる人、目的、CLIA認証など)	13州
	DTC検査を禁止 (医業該当、消費者は検査を発注できないなど)	12州
イギリス	保健省	DTC企業を交えた協議を実施し、2010年に旧・人類遺伝学協議会が「DTC検査サービスに関する原則の共通枠組み」を公表。
フランス	生命倫理関連法(2004改正)	DTC検査を禁止(医業該当)
ドイツ	遺伝子診断法(2009)	DTC検査を禁止(医業該当)
韓国	保健福祉部 遺伝子検査評価院(2005-)	生命倫理法に基づき、実施機関の登録と遺伝学的検査の質評価を実施。DTC販売されていた14種類の検査に関して実施を禁止。

米国については、Genetics and Public Policy Center による2007年調査を参照。イギリス、フランス、ドイツ、韓国については、Borry et al, 20:715-721, 2012; 内閣官房・旧医療イノベーション室勉強会資料(2012, 武藤香織作成)

20

諸外国でのDTC検査規制状況

- 米国
 - 2013年11月22日 FDAは、23andMe に対してサービスの中止を求めた。その理由は、
 - 検査デバイスが医療機器に該当するため要承認
 - BRCAの遺伝リスクや薬剤応答の結果の誤りが重大な過誤をもたらすおそれ
 - FDAが求めた追加情報の提供に未対応
- 中国
 - 2014年2月9日 CFDAは、人のゲノム解析について、シーケンサー、遺伝子検査デバイス等の医療機器登録と、承認を受けるまで中止するよう求める通知を出した。同時に、製品試用の場として臨床応用特区を公募予定であると表明した。
 - 7月2日、BGI社のシーケンサーが医療機器として承認を受けた。
 - 複数の企業が臨床応用特区に申請中。

21

「診療、研究、DTC検査における 偶発的・二次的所見のマネジメント」

米国「生命倫理問題の研究に関する大統領諮問委員会 (PCSB)」(2013.12)

- DTC検査における偶発的・二次的所見を論じた随一の報告書。この報告書では、「所見」を5種類に分類し、対応方策を検討。
- 本事業に関連して重要なのは、以下の2つ。
- 「予期されぬ偶発的所見」
 - 試料採取時には知られていなかった、新しく発見された遺伝的な健康リスクが同定された場合など、現時点では予想できない局面。
- 「予期される二次的所見」
 - 網羅的なゲノム解析を実施して、既知の遺伝子変異が見つかる場合、親子・きょうだいで申込み、結果を照合してみると血縁関係がないことが発覚する場合など、事前にある程度予想できる局面。

22

DTC検査における偶発的所見・二次的所見に関する勧告

米国「生命倫理問題の研究に関する大統領諮問委員会 (PCSBI) 」(2013.12)

Direct-to-Consumer Recommendations

Consent in the Direct-to-Consumer Context

Government Regulation in the Direct-to-Consumer Context

Industry-Wide Best Practices in the Direct-to-Consumer Context

- 事業者は、開示しない予定の所見の範囲について、顧客に前もって伝達するべきである(勧告15)
- 連邦政府は、DTC検査サービスの安全性を監視する機構を、州政府は消費者保護の体制を確立すべきである(勧告16)
- 事業者は、偶発的・二次的所見のマネジメントに関連する業界のベストプラクティスづくりに取り組むべきである。これには、具体的な手順、診療サービスへの紹介基準を含むべきである。(勧告17)

これらの勧告も参考にしつつ、診療や研究での取り組みと調和しながら、DTC検査事業における「所見」への対応を検討する予定。

23

- 利益相反などについて
- 23andMe との相違

24

利益相反などについて

- 東大医科研と DeNA は、共同研究契約を結んでいます。
課題名「予知と予防による健康長寿社会実現」
- 東大医科研 COI STREAM 研究者は、DeNA、DeNA LS の株式、ストックオプションなどを保有せず、また、コンサルテーションなどによる金銭等を受領する行為はしないというポリシーを取っています。
- 東大医科研 COI STREAM の委託費は、DeNA、DeNA LS の行う事業に使われていません。

DeNA: 株式会社ディー・エヌ・エー
DeNA LS: DeNA ライフサイエンス

25

23andMe では提供しているが開発した 疾病リスク予測モデルには含まれない項目

26

23andMe では提供しているが開発したモデルには含まれない疾患・体質

疾患	体質	
<p>オッズ比不明</p> <p>Attention-Deficit Hyperactivity Disorder</p> <p>比較が対死亡</p> <p>Sudden Cardiac Arrest</p> <p>小児疾患・GWASではない</p> <p>Sjögren-Larsson Syndrome</p> <p>Gallstones</p> <p>Progressive Supranuclear Palsy</p> <p>リスクアレルが不明</p> <p>Psoriasis</p> <p>Cleft Lip and Cleft Palate</p> <p>先天性疾患</p> <p>Hypospadias</p> <p>Narcolepsy</p> <p>Gaucher Disease</p> <p>Hypertrophic Cardiomyopathy (MYBPC3 25bp-deletion)</p> <p>Male Infertility</p> <p>Obsessive-Compulsive Disorder</p> <p>Oral and Throat Cancer</p> <p>Peripheral Arterial Disease</p> <p>Preeclampsia</p> <p>Tardive Dyskinesia</p> <p>Agenesis of the Corpus Callosum with Peripheral Neuropathy</p> <p>Alpha-1 Antitrypsin Deficiency</p> <p>Autosomal Recessive Polycystic Kidney Disease</p> <p>Autosomal recessive spastic ataxia of Charlevoix-Saguenay</p> <p>Back Pain</p> <p>Beta Thalassemia</p> <p>Bloom's Syndrome</p> <p>BRCA Cancer Mutations (Selected)</p> <p>Breast Cancer Risk Modifiers</p> <p>Canavan Disease</p> <p>Congenital Disorder of Glycosylation Type 1a (PMM2-CDG)</p> <p>Connexin 26-Related Sensorineural Hearing Loss</p> <p>Cystic Fibrosis</p> <p>D-Bifunctional Protein Deficiency</p> <p>Developmental Dyslexia</p> <p>Dihydropyrimidine Dehydrogenase Deficiency</p> <p>DPD Deficiency</p> <p>Factor XI Deficiency</p> <p>Familial Dysautonomia</p> <p>Familial Hypercholesterolemia Type B</p> <p>Familial Hyperinsulinism (ABCC8-related)</p> <p>Familial Mediterranean Fever</p>	<p>GWASではない</p> <p>Fanconi Anemia (FANCC-related)</p> <p>G6PD Deficiency</p> <p>Glycogen Storage Disease Type 1a</p> <p>Glycogen Storage Disease Type 1b</p> <p>GRACILE Syndrome</p> <p>Hashimoto's Thyroiditis</p> <p>Hemochromatosis (HFE-related)</p> <p>Hereditary Fructose Intolerance</p> <p>Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy</p> <p>LAMB3-related Junctional Epidermolysis Bullosa</p> <p>Larynx Cancer</p> <p>Leigh Syndrome, French Canadian Type (LSFC)</p> <p>Lim-b-girdle Muscular Dystrophy</p> <p>Malaria Complications</p> <p>Malaria Resistance (Duffy Antigen)</p> <p>Maple Syrup Urine Disease Type 1B</p> <p>Medium-Chain Acyl-CoA Dehydrogenase (MCAD) Deficiency</p> <p>Mucopolidosis IV</p> <p>Neural Tube Defects</p> <p>Neuronal Ceroid Lipofuscinosis (CLN5-related)</p> <p>Neuronal Ceroid Lipofuscinosis (PPT1-related)</p> <p>Niemann-Pick Disease Type A</p> <p>Nijmegen Breakage Syndrome</p> <p>Pendred Syndrome</p> <p>Phenylketonuria</p> <p>Placental Abruption</p> <p>Primary Hyperoxaluria Type 2 (PH2)</p> <p>Rhizomelic Chondrodysplasia Punctata Type 1 (RCDP1)</p> <p>Salla Disease</p> <p>Sarcoma</p> <p>Sickle Cell Anemia & Malaria Resistance</p> <p>Squamous Cell Carcinoma</p> <p>Tay-Sachs Disease</p> <p>Torsion Dystonia</p> <p>TTR-Related Cardiac Amyloidosis</p> <p>TTR-Related Familial Amyloid Polyneuropathy</p> <p>Tyrosinemia Type I</p> <p>Usher Syndrome Type I (PCDH15-related)</p> <p>Usher Syndrome Type III</p> <p>Zellweger Syndrome Spectrum</p>	<p>統計的有意性の不足</p> <p>Memory</p> <p>Nicotine Dependence</p> <p>日本人で再現性なし</p> <p>Smoking Behavior</p> <p>SNPアレイにプローブなし</p> <p>Avoidance of Errors</p> <p>Breastfeeding and IQ</p> <p>Cluster Headaches</p> <p>Eating Behavior</p> <p>Food Preference</p> <p>Lactose Intolerance</p> <p>Measures of Intelligence</p> <p>Muscle Performance</p> <p>GWASではない</p> <p>Non-ABO Blood Groups</p> <p>Norovirus Resistance</p> <p>Odor Detection</p> <p>Pain Sensitivity</p> <p>Reading Ability</p> <p>Resistance to HIV/AIDS</p> <p>Response to Diet</p> <p>Response to Exercise</p>

27

まとめ

- 289 の疾病・体質についてSNPデータから疾病リスク予測、体質解析のモデルを構築した
 - 論文の分析、品質管理、情報の更新法の確立
 - 結果の表示法の検討
- DTC遺伝子検査で取り扱う項目の検討・絞り込み
 - 単一遺伝子疾患、家族性腫瘍、小児疾患、先天性疾患、精神疾患、薬剤応答、才能などを除外
- 医業との関係、DTC遺伝子検査に対する倫理的・法的・社会的問題については継続して議論

28